




ETHOFOL[®] 200 EC

HERBICIDE



5 L
ETHOFUMESAAT 200 G/L EC

De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn. Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen kunnen de doseringen verhoogd worden tot 1 liter Ethofol 200 EC + 1 liter of 1 kg metamiton (700 g/L of 70%) + 160 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 1 liter fenmedifam (157 of 160 g/L) per hectare).

Mengvoorschriften

Ethofol 200 EC toegepast in combinatie met middelen op basis van fenmedifam en eventueel metamiton:

- Giet 20-50 liter water in de tank
- Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking
- Voeg water toe tot de helft van de benodigde hoeveelheid
- Voeg Ethofol200 EC en eventueel metamiton toe
- Vul verder aan met water

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

Restricties:

- Spuit op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
- Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18°C en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur 's avonds spuiten.

Cichorei

In cichorei is Ethofol 200 EC toegelaten in een LDS systeem na opkomst. Het advies is om Ethofol 200 EC toe te voegen aan een LDS mengsel met toegelaten middelen vanaf eerste echte blad van de cichorei.

Dosering: 0,25-0,375 L/ha Ethofol 200 EC in LDS systeem met toegelaten middelen

Maximaal 4 toepassingen per teelt, totaal dosering maximaal 1,0 L/ha Ethofol 200 EC per teelt.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen

Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden

Inslukken Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum

Inademing In de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

ETHOFOL® 200 EC
TOELATINGSNUMMER
FORMULERING
AARD WERKING
WERKZAME STOF
GEHALTE
BEVAT

: 10568 N 
: EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC)
: HERBICIDE
: ETHOFUMESAAT
: 200 G/L
: CYCLOHEXANON; ETHYLBENZEEN; XYLEEN

GEVARENAANDUIDINGEN

- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen, niet roken.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door:
UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300

Toelatingshouder:
UPL Europe Ltd.
The Engine Rooms, 1st Floor
Birchwood Park
Warrington, Cheshire
WA3 6YN, United Kingdom



INHOUD: 5 LTR

° Gedeponoord handelsmerk van UPL Europe Ltd

UN 1993

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking



GEVAAR

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teelt- cyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teelt- cyclus	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 L/ha ¹	2	4 L/ha	10
			2,5 L/ha ²	1		-
			0,5 - 1 L/ha ³	8		7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ In combinatie met 3,5 L/ha fenmedifam (160 g/L).

² In combinatie met 5 L/ha fenmedifam (160 g/L).

³ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Het gebruik in de teelt van chichorei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teelt- cyclus	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen
Cichorei	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,25-0,5 L/ ha ¹	4 per teelt- cyclus	1 L/ha per teeltcyclus	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten en chichorei het middel toepassen in 200-300 liter water per ha.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen bladgroenten, aardappelen, bieten en wortel- en knolgewassen telen.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, zaai- en plantuien.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Ethofol 200 EC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Ethofol 200 EC een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleeftkruid. Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

Suiker- en voederbieten

Ethofol 200 EC is na opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam.

Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleeftkruid op alle grondsoorten.

Dosering:

Vanaf het 2 bladstadium (BBCH 12) van de biet:

1,5 liter Ethofol 200 EC + 560 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 3,5 liter fenmedifam (157 of 160 g/L) per hectare).

Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 1,5 liter Ethofol 200 EC + 560 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 3,5 liter fenmedifam (157 of 160 g/L) per hectare). Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

Dosering:

Vanaf het 4 bladstadium (BBCH 14) van de biet:

2,5 liter Ethofol 200 EC + 800 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 5 liter fenmedifam (157 of 160 g/L) per hectare) als enkelvoudige behandeling.

Ook kan gekozen worden voor toepassing in een tankmix in een Lage-Dosering-Systeem, op onkruiden in het kiembladstadium.

Dosering:

0,5 liter Ethofol 200 EC + 0,5 liter of 0,5 kg metamitron (700 g/L of 70%) + 80 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 0,5 liter fenmedifam (157 of 160 g/L) per hectare).

Indien gewenst kan 0,5 L/ha olie (voor deze toepassing geschikt) worden toegevoegd.