

OBLIX® 500 SC
TOELATINGSNUMMER

: 10319 N

(W12)

FORMULERING

: **SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC)**

AARD WERKING

: **HERBICIDE**

WERKZAME STOF

: **ETHOFUMESAAT**

GEHALTE

: **500 G/L**

Professioneel gebruik.

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

SP1 Zorg er voor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



WAARSCHUWING

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300

Toelatingshouder:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144 A
4818 CP Breda



GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

INHOUD: 5 LTR

® Gedeponoord handelsmerk van UPL Europe Ltd.



CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking

Zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras

Dosering:

- 1,0 liter per hectare.

Zaadteelt van overige grassen

Aangezien voor deze toepassing geen gegevens over fytotoxiciteit zijn beoordeeld, is het gebruik van Oblix® 500 SC in deze teelt voor eigen risico van de teler. Het verdient aanbeveling vooraf advies te vragen bij de teeltadviseur over de gevoeligheid van de betreffende soort en de te gebruiken dosering.

Graszodenteelt

Aangezien voor deze toepassing geen gegevens over fytotoxiciteit zijn beoordeeld, is het gebruik van Oblix® 500 SC in deze teelt voor eigen risico van de teler. Het verdient aanbeveling vooraf advies te vragen bij de teeltadviseur over de gevoeligheid van de grassoorten die voorkomen in de zode en de te gebruiken dosering.

Cichorei

In cichorei is Oblix® 500 SC toegelaten in een LDS systeem na opkomst. Het advies is om Oblix® 500 SC toe te voegen aan een LDS mengsel met toegelaten middelen vanaf het eerste echte blad van de cichorei.

Dosering:

- 0,1 – 0,15 L/ha Oblix® 500 SC in LDS systeem met toegelaten middelen.

Restricties

- Spuit op een afgehard, droog en gezond gewas.
- Spuit niet op een gewas dat verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
- Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten.

Spuitvoorschriften

- Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur.
- Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.
- Vermijd gebruik van kalk- of ijzerhoudend water.
- Spuit direct na gereedmaken van de spuitvloeistof en houd deze voortdurend in beweging.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen Bij contact met de ogen, contactlenzen verwijderen en onmiddellijk gedurende tenminste 15 minuten spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water afwassen; alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.

Inslikken De mond spoelen. Waarschuw een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.

Inademing In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,6 L/ha ¹	2 per teeltcyclus	1,6 L/ha per teeltcyclus	10
			1 L/ha ²	1 per teeltcyclus		-
			0,2 - 0,4 L/ha ³	8 per teeltcyclus		7
Graszaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras	Over het gewas	Vogelmuur ⁴	1 L/ha	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 In combinatie met 3,5 L/ha fenmedifam (160 g/L).

2 In combinatie met 5 L/ha fenmedifam (160 g/L).

3 In LDS-systeem met toegelaten middelen.

4 Vogelmuur (*Stellaria media*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Graszaadteelt m.u.v. Engels en Italiaans raaigras	Over het gewas	Vogelmuur ⁴	1 L/ha	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-	-
Graszodenteelt	Over het gewas	Vogelmuur ⁴	1 L/ha	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-	-
Cichorei	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 - 0,2 L/ha ¹	4 per teeltcyclus	0,4 L/ha per teeltcyclus	7	-
Spinazie (onbedekte teelt)	Voor-zaai of voor-opkomst	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	0,8 l/ha per teeltcyclus	-	42
Snijbiet (onbedekte teelt)	Voor-zaai of voor-opkomst	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	0,8 l/ha per teeltcyclus	-	42
Tuinmelde (onbedekte teelt)	Voor-zaai of voor-opkomst	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	0,8 l/ha per teeltcyclus	-	42
Boon met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst, bij 1-3 driefolvige bladeren (BBCH 11-13)	Vogelmuur ⁴	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-	-

Erwt met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst, bij 1-3 drievoudige bladeren (BBCH 11-13)	Vogelmuur ⁴	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-	-
Bonenkruid, peterselie, majoraan, oregano, rozemarijn, salie, tijm (onbedekte teelt)	Na opkomst of na het planten	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	10	28
Trekheesters (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	10	-
Snijgroen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	10	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	10	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	10	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

⁴ Vogelmuur (*Stellaria media*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-300 liter water per ha.

Hooi afkomstig van graszaad productie niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen bladgroenten, aardappelen, bieten en wortel- en knolgewassen telen.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geplouwd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, zaai- en plantuien.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Oblix® 500 SC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Oblix® 500 SC een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid.

Bieten

Oblix® 500 SC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam. Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleeftkruid op alle grondsoorten.

Dosering:

- vanaf het 2-bladstadium (BBCH 12) van de biet

0,6 liter Oblix® 500 SC + 3,5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.

Zo nodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 0,6 liter Oblix® 500 SC + 3,5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.

Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten minimaal 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

- vanaf het 4-bladstadium (BBCH 14) van de biet

1 liter Oblix® 500 SC + 5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.

- Lage-Dosering-Systeem, op onkruiden in het kiembladstadium:

0,2 liter Oblix® 500 SC + 0,5 liter of 0,5 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 0,5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.

Indien gewenst kan 0,5 liter/ha olie (voor deze toepassing geschikt) worden toegevoegd.

De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn.

Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen, kunnen de doseringen verhoogd worden tot maximaal 0,4 liter Oblix® 500 SC + 1 liter of 1 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 1 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare).

Graszaadteelt en graszodenteelt

Oblix® 500 SC bestrijdt vogelmuur in de graszaad- en graszodenteelt. Toepassing vindt bij voorkeur in het najaar plaats, op kleine onkruiden. Oblix® 500 SC kan worden gespoten vanaf het moment dat het gras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de oogst van de dekrucht dient het gras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen. Spuit op een gezond gewas.